

ABBREVIATED LABEL: FarmVet AMITRAZ 20 %  
OUTER CONTAINER – 100 ml, 200 ml AND 500 ml

FOR EXTERNAL ANIMAL USE ONLY

SLEGS VIR UITWENDIGE DIEREGBRUIK

**FarmVet AMITRAZ 20 %**  
Reg. No. G0000 Act 36/1947

**Emulsifiable concentrate/Emulsifiseerbare konsentraat**

**CATTLE/BEESTE**  
**CONTROLS TICKS. KILLS LICE AND MANGE MITES.**  
**BEHEER BOSLUISE. DOOD LUISE EN SKURFTEMYTE.**

**SHEEP AND GOATS/SKAPE EN BOKKE**  
**CONTROLS TICKS. CONTROLS SHEEP SCAB. KILLS ITCH MITES AND GOAT MANGE MITES.**  
**BEHEER BOSLUISE. BEHEER SKAAPBRANDSIEKTE. DOOD JEUKMYTE EN BOKSKURFTEMYTE.**

**OXPECKER COMPATIBLE/RENOSTERVOËL VERSOENBAAR**

**CAUTION/VERSIGTIG**

PROTECT FROM EXTREMES OF HEAT AND COLD AND FROM DAMPNES  
BESKERM TEEN UITERMATIGE HITTE EN KOUE EN TEEN KLAMHEID

**COMPOSITION/SAMESTELLING**  
**Amitraz/Amitras 20,0 % m/v**

**(100 ml, 200 ml, 500 ml)**

**FOR FULL PARTICULARS SEE ENCLOSED PACKAGE INSERT**  
**VIR VOLLE BESONDERHEDE SIEN INGESLOTE VOUBILJET**

**Registration holder/Registrasiehouer:**

FARMVET ANIMAL HEALTH (PTY) LIMITED  
Co./Mpy. Reg. No. 2011/006806/07  
P O Box/Posbus 10413, ASTON MANOR 1630, Gauteng, R.S.A  
Tel/Fax: 011 396 2233

Lot No.  
Expiry/Verval:

APPLICATION FOR DAUGHTER REGISTRATION  
FARMVET ANIMAL HEALTH (PTY) LIMITED: FarmVet AMITRAZ 20 %  
MOTHER REGISTRATION: TIXAGON 200 (G3617)  
Submitted: April 2013 (1<sup>st</sup> Draft)

Page 1 of 13

ABBREVIATED LABEL: FarmVet AMITRAZ 20 %  
IMMEDIATE CONTAINER – 100 ml, 200 ml AND 500 ml

FOR EXTERNAL ANIMAL USE ONLY

SLEGS VIR UITWENDIGE DIEREGERBUIK

**FarmVet AMITRAZ 20 %**  
Reg. No. G0000 Act 36/1947

**Emulsifiable concentrate/Emulsifiseerbare konsentraat**

**CATTLE/BEESTE**  
**CONTROLS TICKS. KILLS LICE AND MANGE MITES.**  
**BEHEER BOSLUISE. DOOD LUISE EN SKURFTEMYTE.**

**SHEEP AND GOATS/SKAPE EN BOKKE**  
**CONTROLS TICKS. CONTROLS SHEEP SCAB. KILLS ITCH MITES AND GOAT MANGE MITES.**  
**BEHEER BOSLUISE. BEHEER SKAAPBRANDSIEKTE. DOOD JEUKMYTE EN BOKSKURFTEMYTE.**

**OXPECKER COMPATIBLE/RENOSTERVOËL VERSOENBAAR**

**CAUTION/VERSIGTIG**

PROTECT FROM EXTREMES OF HEAT AND COLD AND FROM DAMPNES  
BESKERM TEEN UITERMATIGE HITTE EN KOUE EN TEEN KLAMHEID

**COMPOSITION/SAMESTELLING**  
**Amitraz/Amitras 20,0 % m/v**

**(100 ml, 200 ml, 500 ml)**

**FOR FULL PARTICULARS SEE ENCLOSED PACKAGE INSERT**  
**VIR VOLLE BESONDERHEDE SIEN INGESLOTE VOUBILJET**

**Registration holder/Registrasiehouer:**

FARMVET ANIMAL HEALTH (PTY) LIMITED  
Co./Mpy. Reg. No. 2011/006806/07  
P O Box/Posbus 10413, ASTON MANOR 1630, Gauteng, R.S.A.  
Tel/Fax: 011 396 2233

Lot No.  
Expiry/Verval:

PACKAGE INSERT: FarmVet AMITRAZ 20 %  
100 ml, 200 ml AND 500 ml

FOR EXTERNAL ANIMAL USE ONLY

**FarmVet AMITRAZ 20 %**  
Reg. No. G0000 Act 36/1947

**Emulsifiable concentrate**

**OXPECKER COMPATIBLE**

**CAUTION**

**STORAGE INSTRUCTIONS**

Protect product from extremes of heat and cold and from dampness.

**COMPOSITION**

Amitraz 20,0 % m/v

**INDICATIONS**

**CATTLE**

Controls ticks. Kills lice and mange mites.

**SHEEP AND GOATS**

Controls ticks. Controls sheep scab. Kills itch mites and goat mange mites.

**WARNINGS**

- **WITHDRAWAL PERIOD:**
  - DO NOT SLAUGHTER ANIMALS FOR HUMAN CONSUMPTION WITHIN 7 DAYS OF LAST DIPPING.
- DO NOT USE ON HORSES.
- In case of poisoning call a doctor and make this label available to him.
- Keep out of reach of children, uninformed persons and animals.
- Although this remedy has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

**PRECAUTIONS**

- Tightly reseal the container if all the contents have not been used.
- Destroy empty containers.
- Wash hands thoroughly after use.

**DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED**

For external use on cattle, sheep and goats.

FarmVet AMITRAZ 20 % should not be mixed with any other dip.

**CATTLE**

- **Spraying**

Dipwash should be freshly prepared of each spraying.

While stirring, add ± 10 l water to the required amount of FarmVet AMITRAZ 20 % in a suitable container to form a pre-cream. Add the pre-creamed product to the spray sump and circulate through the tank for 10 minutes in order to ensure adequate mixing of the dipwash.

Use at a rate as per the table below:

<b>FarmVet AMITRAZ 20 %</b>	<b>WATER</b>
100 mℓ	80 ℓ
200 mℓ	160 ℓ
500 mℓ	400 ℓ
1 ℓ	800 ℓ
5 ℓ	4 000 ℓ
10 ℓ	8 000 ℓ
20 ℓ	16 000 ℓ

### **Boost**

It is recommended that not more than 400 head be sprayed in the spray race at one time, especially where fouling is a problem. If, however, this figure is exceeded, boosting at the rate of 100 mℓ per 100 head commencing at 400 head can be undertaken to maintain a satisfactory deposit of active ingredient, especially where tick-borne diseases are a problem.

- **Plunge dip**

**Total replenishment:** This requires that the diptank is topped up to the desired level on each dipping occasion. Pre-cream by adding 10ℓ water to the required amount of FarmVet AMITRAZ 20 % while stirring. 1 ℓ FarmVet AMITRAZ 20 % is enough to charge 4 000 ℓ water.

### **Lime stabilised:**

- **Fresh fill**

Pre-cream by adding 10ℓ of water to the required amount of FarmVet AMITRAZ 20 % while stirring. 1ℓ of FarmVet AMITRAZ 20 % is enough to charge 800 ℓ water.

- **Replenishment**

Pre-cream by adding 10ℓ of water to the required amount of FarmVet AMITRAZ 20 % while stirring. 1ℓ of Ecotraz 200 is enough to charge 800 ℓ water.

At the end of each dipping, calcium hydroxide (75 %) must be added to the tank at a rate of 5 kg per 100 head of cattle dipped to ensure that the dipwash pH is in the region of 12.

- **“Head Count” Replenishment System**

After dipping use the following table to calculate how much FarmVet AMITRAZ 20 % needs to be added to the diptank and then add water to fill the diptank to the required level.

<b>Number of animals dipped</b>	<b>Quantity of Ecotraz 200 to be added to the diptank</b>
10	34 mℓ
20	69 mℓ
50	173 mℓ
100	347 mℓ
1000	3.475 ℓ

Note: 1ℓ of Ecotraz 200 will replenish sufficient dipwash to dip 287 cattle.

At the end of each dipping, calcium hydroxide (75 %) must be added to the tank at a rate of 5 kg per 100 head of cattle dipped to ensure that the dipwash pH is in the region of 12.

### **Frequency:**

- **Ticks and mange** Spray/dip weekly
- **Lice** Spray/dip twice with a 7 day interval

Should dipping intervals extend beyond 3 weeks, additional lime should be added at a rate of 1 kg lime (75 % active) per 1 000 ℓ water in the diptank. The dipwash should be adequately protected for 2 months if this procedure is followed.

### **SHEEP AND GOATS**

FarmVet AMITRAZ 20 % should be administered by means of either:

1. 2 Dippings using fresh, unstabilised dipwash. FarmVet AMITRAZ 20 % should be added at a rate of 1 ℓ per 600 ℓ water, taking the total amount of water in the tank into consideration.  
OR
2. A fresh, unstabilised dipwash for the first dipping, which is then stabilised with the addition of lime at a rate of 4 kg lime per 750 ℓ dipwash, added immediately after the initial dipping. This stabilised dipwash is then suitable for the second dipping, 7 days later.

### **Frequency:**

Sheep and goats should be dipped twice with a 7 day interval to kill sheep scab, itch and goat mange mites. Ensure that the animals are immersed for approximately 1 minute with the heads being submerged at least 3 times in order to ensure that the inside of the ears are thoroughly wetted.

### **N.B.**

Sheep scab is a notifiable disease and must be reported to the nearest State Veterinarian.

### **Registration holder:**

FARMVET ANIMAL HEALTH (PTY) LIMITED  
Co. Reg. No. 2011/006806/07  
P O Box 10413, ASTON MANOR 1630, Gauteng, R.S.A.  
Tel/Fax: 011 396 2233

VOUBILJET: FarmVet AMITRAZ 20 %  
100 ml, 200 ml AND 500 ml

SLEGS VIR UITWENDIGE DIEREGERBUIK

**FarmVet AMITRAZ 20 %**  
Reg. No. G0000 Wet 36/1947

**Emulsifiseerbare konsentraat**

**RENOSTERVOËL VERSOENBAAR**

**VERSIGTIG**

**BERGINGSAAWYSINGS**

Beskerm teen uitermatige hitte en koue en teen klamheid.

**SAMESTELLING**

Amitras 20,0 % m/v

**INDIKASIES**

**BEESTE**

Beheer bosluise. Dood luise en skurftemyte.

**SKAPE EN BOKKE**

Beheer bosluise. Beheer skaapbrandsiekte. Dood jeukmyte en bokskurftemyte.

**WAARSKUWINGS**

• **ONTREKKINGSPERIODE:**

- MOENIE DIERE VIR MENSLIKE VERBRUIK BINNE 7 DAE VANAF DIE LAASTE DIPPING SLAG NIE.
- MOENIE OP PERDE GEBRUIK NIE.
- In geval van vergiftiging raadpleeg 'n geneesheer en stel hierdie etiket aan hom beskikbaar.
- Hou buite bereik van kinders, ongeligte persone en diere.
- Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder 'n wye verskeidenheid van toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg 'n veearts en verwittig die registrasiehouer.

**VOORSORGMAATREËLS**

- Herseël die houer dig indien al die inhoud nie gebruik is nie.
- Vernietig leë houers.
- Was hande deeglik na gebruik.

**GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI**

Vir uitwendige gebruik op beeste, skape en bokke.

FarmVet AMITRAZ 20 % behoort nie met enige ander dip gemeng te word nie

**BEESTE**

• **Bespuiting**

Dipmengsel behoort vars opgemaak te word voor elke bespuiting.

Plaas die vereiste hoeveelheid Ecotraz 200 in 'n geskikte houer en voeg ± 10 l water daarby terwyl geroer word om 'n voormengsel te maak. Voeg die voormengsel by die spuitgang se dipbak.. Sirkuleer die dipmengsel deur die dipbak vir 10 minute sodat vermenging deeglik geskied.

Gebruik teen 'n koers soos in die tabel hieronder:

<b>FarmVet AMITRAZ 20 %</b>	<b>WATER</b>
100 mℓ	80 ℓ
200 mℓ	160 ℓ
500 mℓ	400 ℓ
1 ℓ	800 ℓ
5 ℓ	4 000 ℓ
10 ℓ	8 000 ℓ
20 ℓ	16 000 ℓ

### Versterking

Dit word aanbeveel dat nie meer as 400 beeste op een tydstip in die spuitdip bespuit word nie, veral waar besoedeling 'n probleem is. As hierdie getal oorskry word kan versterking teen 'n koers van 100 mℓ per 100 diere gedoen word om 'n aanvaarbare neerslag van aktiewe bestanddeel te verseker, veral waar bosluis oordraagbare siektes 'n probleem is.

- **Dompeldip**

**Totale aanvulling:**

Dit verg dat die dipbak met elke dipping tot by die gewenste vlak aangevul word

Plaas die vereiste hoeveelheid FarmVet AMITRAZ 20 % in 'n geskikte houer en voeg ongeveer 10 ℓ water daarby terwyl geroer word om 'n voormengsel te maak. Voeg die voormengsel dan by die water in die diptenk. Die eerste 50 diere wat gedip word, word gebruik om die dipmenseel deeglik te meng. Hierdie 50 diere moet weer gedip word.

1 ℓ FarmVet AMITRAZ 20 % is genoeg om 4 000 ℓ water te versterk.

**Stabilisering met kalk:**

- **Varsvulling:**

Plaas die vereiste hoeveelheid FarmVet AMITRAZ 20 % in 'n geskikte houer en voeg ongeveer 10 ℓ water daarby terwyl geroer word om 'n voormengsel te maak. Voeg die voormengsel dan by die water in die diptenk.. Die eerste 50 diere wat gedip word, word gebruik om die dipmenseel deeglik te meng. Hierdie 50 diere moet weer gedip word. 1 ℓ FarmVet AMITRAZ 20 % is genoeg om 800 ℓ water te versterk.

- **Aanvulling**

Dit verg dat die dipbak met elke dipping tot by die gewenste vlak aangevul word

Plaas die vereiste hoeveelheid FarmVet AMITRAZ 20 % in 'n geskikte houer en voeg ongeveer 10 ℓ water daarby terwyl geroer word om 'n voormengsel te maak. Voeg die voormengsel dan by die water in die diptenk. Die eerste 50 diere wat gedip word, word gebruik om die dipmenseel deeglik te meng. Hierdie 50 diere moet weer gedip word. 1 ℓ FarmVet AMITRAZ 20 % is genoeg om 800 ℓ water te versterk.

Aan die einde van elke dipping, moet kalsiumhidroksied (75 %) teen 'n koers van 5 kg per 100 kop beeste gedip by die dipbak gevoeg word, om te verseker dat die dipmenseel se pH in die omgewing van 12 is.

- **“Head Count” Aanvulling Stelsel**

Na dipping gebruik die onderstaande tabel om te bereken hoeveel FarmVet AMITRAZ 20 % by die dipbak bygevoeg moet word. Voeg die nodige hoeveelheid FarmVet AMITRAZ 20 % by die dipbak en maak dan vol met water tot by die vereiste vlak.

<b>Aantal diere gedip</b>	<b>Hoeveelheid Ecotraz 200 wat by die dipbak gevoeg moet word</b>
10	34 mℓ
20	69 mℓ
50	173 mℓ
100	347 mℓ
1000	3.475 ℓ

Nota: 1 ℓ Ecotraz 200 sal genoeg dipmenseel aanvul vir die dip van 287 beeste.

Aan die einde van elke dipping, moet kalsiumhidroksied (75 %) teen 'n koers van 5 kg per 100 kop beeste gedip by die dipbak gevoeg word, om te verseker dat die dipmenseel se pH in die omgewing van 12 is.

**Diptussenpose:**

- **Bosluise en myte** Bespuit/dip weekliks
- **Luise** Bespuit/dip twee maal met 'n tussenpose van 7 dae

As die dip tussenpose langer as 3 weke is, moet addisionele kalk bygevoeg word teen 'n koers van 1 kg kalk (75 % aktief) per 1 000 ℓ water in die dipmengsel. As hierdie prosedure gevolg word behoort dit die dipmengsel vir 2 maande voldoende te beskerm.

**SKAPE EN BOKKE**

FarmVet AMITRAZ 20 % behoort soos volg aangewend te word:

1. 2 Dippings met vars, ongestabiliseerde dipmengsel. FarmVet AMITRAZ 20 % moet bygevoeg word teen 'n koers van 1 ℓ per 600 ℓ water, met die totale hoeveelheid water in die dipbak in berekening gebring.  
OF
2. 'n Vars, ongestabiliseerde dipmengsel word gebruik vir die eerste dipping. Stabiliseer dan die dipmengsel deur kalk by te voeg teen 'n koers van 4 kg kalk per 750 ℓ dipmengsel, onmiddellik na die eerste dipping. Hierdie gestabiliseerde dipmengsel is dan geskik vir die tweede dipping 7 dae later.

**Diptussenpose:**

Skaap en bokke moet twee keer gedip word met 'n 7 dae tussenpose om skaapbrandsiekte- jeuk en bokskurftemyte te dood. Verseker dat die diere vir ongeveer 1 minuut gedompel is, en dat hulle koppe ten minste 3 keer gedompel word om sodoende deeglike benatting van die binnekant van die ore te verseker.

**L.W.**

Skaapbrandsiekte is 'n aanmeldbare siekte en moet by die naaste Staatsveearts aangemeld word.

**Registrasiehouer:**

FARMVET ANIMAL HEALTH (PTY) LIMITED  
Mpy. Reg. No. 2011/006806/07  
Posbus 10413, ASTON MANOR 1630, Gauteng, R.S.A.  
Tel/Fax: 011 396 2233



LABEL: FarmVet AMITRAZ 20 %  
OUTER CONTAINER – MAIN PANEL  
1 ℓ, 5 ℓ, 10 ℓ AND 20 ℓ

FOR EXTERNAL ANIMAL USE ONLY

SLEGS VIR UITWENDIGE DIEREGERBUIK

**FarmVet AMITRAZ 20 %**  
Reg. No. G0000 Act 36/1947

**Emulsifiable concentrate/Emulsifiseerbare konsentraat**

**CATTLE/BEESTE**  
**CONTROLS TICKS. KILLS LICE AND MANGE MITES.**  
**BEHEER BOSLUISE. DOOD LUISE EN SKURFTEMYTE.**

**SHEEP AND GOATS/SKAPE EN BOKKE**  
**CONTROLS TICKS. CONTROLS SHEEP SCAB. KILLS ITCH MITES AND GOAT MANGE MITES.**  
**BEHEER BOSLUISE. BEHEER SKAAPBRANDSIEKTE. DOOD JEUKMYTE EN BOKSKURFTEMYTE.**

**OXPECKER COMPATIBLE/RENOSTERVOËL VERSOENBAAR**

**CAUTION/VERSIGTIG**

PROTECT FROM EXTREMES OF HEAT AND COLD AND FROM DAMPNES  
BESKERM TEEN UITERMATIGE HITTE EN KOUE EN TEEN KLAMHEID

**COMPOSITION/SAMESTELLING**  
**Amitraz/Amitras 20,0 % m/v**

**1 ℓ, 5 ℓ, 10 ℓ and 20 ℓ**

**Registration holder/Registrasiehouer:**  
ECO Animal Health Southern Africa (Pty) Ltd  
ECO Dieregesondheid Suider-Afrika (Edms) Bpk  
Co./Mpy. Reg. No. 92/00835/07

**Marketed by/Bemark deur:**  
Afrivet Business Management (Pty) Ltd  
Co/Mpy. Reg. No. 2000/011263/07  
P O Box/Posbus 2009, Faerie Glen 0043, R.S.A.  
Tel: 012 991 6416  
Fax: 012 991 6417  
Helpline/Hulplyn: 0860 833 2787  
Web: www.afrivet.co.za

Lot No.  
Expiry/Verval:

LABEL: FarmVet AMITRAZ 20 %  
OUTER CONTAINER  
1 ℓ, 5 ℓ, 10 ℓ AND 20 ℓ

#### WARNINGS

- **WITHDRAWAL PERIOD:**
  - DO NOT SLAUGHTER ANIMALS FOR HUMAN CONSUMPTION WITHIN 7 DAYS OF LAST DIPPING.
- DO NOT USE ON HORSES.
- In case of poisoning call a doctor and make this label available to him.
- Keep out of reach of children, uninformed persons and animals.
- Although this remedy has been extensively tested under a large variety of conditions, failure thereof may ensue as a result of a wide range of reasons. If this is suspected, seek veterinary advice and notify the registration holder.

#### PRECAUTIONS

- Tightly reseal the container if all the contents have not been used.
- Destroy empty containers.
- Wash hands thoroughly after use.

#### DIRECTIONS FOR USE – USE ONLY AS DIRECTED

For external use on cattle, sheep and goats.

FarmVet AMITRAZ 20 % should not be mixed with any other dip.

#### CATTLE

- **Spraying**

Dipwash should be freshly prepared of each spraying.

While stirring, add ± 10 ℓ water to the required amount of FarmVet AMITRAZ 20 % in a suitable container to form a pre-cream. Add the pre-creamed product to the spray sump and circulate through the tank for 10 minutes in order to ensure adequate mixing of the dipwash.

Use at a rate as per the table below:

FarmVet AMITRAZ 20 %	WATER
100 mℓ	80 ℓ
200 mℓ	160 ℓ
500 mℓ	400 ℓ
1 ℓ	800 ℓ
5 ℓ	4 000 ℓ
10 ℓ	8 000 ℓ
20 ℓ	16 000 ℓ

#### Boost

It is recommended that not more than 400 head be sprayed in the spray race at one time, especially where fouling is a problem. If, however, this figure is exceeded, boosting at the rate of 100 mℓ per 100 head commencing at 400 head can be undertaken to maintain a satisfactory deposit of active ingredient, especially where tick-borne diseases are a problem.

- **Plunge dip**

**Total replenishment:** This requires that the diptank is topped up to the desired level on each dipping occasion. Pre-cream by adding 10ℓ water to the required amount of FarmVet AMITRAZ 20 % while stirring. 1 ℓ FarmVet AMITRAZ 20 % is enough to charge 4 000 ℓ water.

**Lime stabilised:**

- **Fresh fill**

Pre-cream by adding 10ℓ of water to the required amount of FarmVet AMITRAZ 20 % while stirring. 1ℓ of FarmVet AMITRAZ 20 % is enough to charge 800 ℓ water.

At the end of each dipping add 6 kg calcium hydroxide (75 %) per 1 000 ℓ water.

- **Replenishment**

Pre-cream by adding 10ℓ of water to the required amount of FarmVet AMITRAZ 20 % while stirring. 1ℓ of FarmVet AMITRAZ 20 % is enough to charge 800 ℓ water.

At the end of each dipping, calcium hydroxide (75 %) must be added to the tank at a rate of 5 kg per 100 head of cattle dipped to ensure that the dipwash pH is in the region of 12.

- **“Head Count” Replenishment System**

After dipping use the following table to calculate how much FarmVet AMITRAZ 20 % needs to be added to the diptank and then add water to fill the diptank to the required level.

Number of animals dipped	Quantity of Ecotraz 200 to be added to the diptank
10	34 mℓ
20	69 mℓ
50	173 mℓ
100	347 mℓ
1000	3.475 ℓ

Note: 1ℓ of Ecotraz 200 will replenish sufficient dipwash to dip 287 cattle.

At the end of each dipping, calcium hydroxide (75 %) must be added to the tank at a rate of 5 kg per 100 head of cattle dipped to ensure that the dipwash pH is in the region of 12.

**Frequency:**

- **Ticks and mange** Spray/dip weekly
- **Lice** Spray/dip twice with a 7 day interval

Should dipping intervals extend beyond 3 weeks, additional lime should be added at a rate of 1 kg lime (75 % active) per 1 000 ℓ water in the diptank. The dipwash should be adequately protected for 2 months if this procedure is followed.

**SHEEP AND GOATS**

FarmVet AMITRAZ 20 % should be administered by means of either:

1. Dippings using fresh, unstabilised dipwash. FarmVet AMITRAZ 20 % should be added at a rate of 1 ℓ per 600 ℓ water, taking the total amount of water in the tank into consideration.  
OR
2. A fresh, unstabilised dipwash for the first dipping, which is then stabilised with the addition of lime at a rate of 4 kg lime per 750 ℓ dipwash, added immediately after the initial dipping. This stabilised dipwash is then suitable for the second dipping, 7 days later.

**Frequency:**

Sheep and goats should be dipped twice with a 7 day interval to kill sheep scab, itch and goat mange mites. Ensure that the animals are immersed for approximately 1 minute with the heads being submerged at least 3 times in order to ensure that the inside of the ears are thoroughly wetted.

**N.B.**

Sheep scab is a notifiable disease and must be reported to the nearest State Veterinarian.

## WAARSKUWINGS

### • ONTREKKINGSPERIODE:

- MOENIE DIERE VIR MENSLIKE VERBRUIK BINNE 7 DAE VANAF DIE LAASTE DIPPING SLAG NIE.
- MOENIE OP PERDE GEBRUIK NIE.
- In geval van vergiftiging raadpleeg 'n geneesheer en stel hierdie etiket aan hom beskikbaar.
- Hou buite bereik van kinders, ongeligte persone en diere.
- Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder 'n wye verskeidenheid van toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg 'n veearts en verwittig die registrasiehouer.

## VOORSORGMAATREËLS

- Herseël die houer dig indien al die inhoud nie gebruik is nie.
- Vernietig leë houers.
- Was hande deeglik na gebruik.

## GEBRUIKSAANWYSINGS – GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI

Vir uitwendige gebruik op beeste, skape en bokke.

FarmVet AMITRAZ 20 % behoort nie met enige ander dip gemeng te word nie

## BEESTE

### • Bespuiting

Dipmengsel behoort vars opgemaak te word voor elke bespuiting.

Plaas die vereiste hoeveelheid Ecotraz 200 in 'n geskikte houer en voeg ± 10 ℓ water daarby terwyl geroer word om 'n voormengsel te maak. Voeg die voormengsel by die spuitgang se dipbak.. Sirkuleer die dipmengsel deur die dipbak vir 10 minute sodat vermenging deeglik geskied.

Gebruik teen 'n koers soos in die tabel hieronder:

FarmVet AMITRAZ 20 %	WATER
100 mℓ	80 ℓ
200 mℓ	160 ℓ
500 mℓ	400 ℓ
1 ℓ	800 ℓ
5 ℓ	4 000 ℓ
10 ℓ	8 000 ℓ
20 ℓ	16 000 ℓ

## Versterking

Dit word aanbeveel dat nie meer as 400 beeste op een tydstip in die spuitdip bespuit word nie, veral waar besoedeling 'n probleem is. As hierdie getal oorskry word kan versterking teen 'n koers van 100 mℓ per 100 diere gedoen word om 'n aanvaarbare neerslag van aktiewe bestanddeel te verseker, veral waar bosluis oordraagbare siektes 'n probleem is.

### • Dompeldip

#### Totale aanvulling:

Dit verg dat die dipbak met elke dipping tot by die gewenste vlak aangevul word

Plaas die vereiste hoeveelheid FarmVet AMITRAZ 20 % in 'n geskikte houer en voeg ongeveer 10 ℓ water daarby terwyl geroer word om 'n voormengsel te maak. Voeg die voormengsel dan by die water in die diptenk. Die eerste 50 diere wat gedip word, word gebruik om die dipmenseel deeglik te meng. Hierdie 50 diere moet weer gedip word.

1 ℓ FarmVet AMITRAZ 20 % is genoeg om 4 000 ℓ water te versterk.

#### Stabilisering met kalk:

##### • Varsvulling:

Plaas die vereiste hoeveelheid FarmVet AMITRAZ 20 % in 'n geskikte houer en voeg ongeveer 10 ℓ water daarby terwyl geroer word om 'n voormengsel te maak. Voeg die voormengsel dan by die water in die diptenk.. Die eerste 50 diere wat gedip word, word gebruik om die dipmenseel deeglik te meng. Hierdie 50 diere moet weer gedip word. 1 ℓ FarmVet AMITRAZ 20 % is genoeg om 800 ℓ water te versterk.

APPLICATION FOR DAUGHTER REGISTRATION

FARMVET ANIMAL HEALTH (PTY) LIMITED: FarmVet AMITRAZ 20 %

MOTHER REGISTRATION: TIXAGON 200 (G3617)

Submitted: April 2013 (1<sup>st</sup> Draft)

### • **Aanvulling**

Dit verg dat die dipbak met elke dipping tot by die gewenste vlak aangevul word

Plaas die vereiste hoeveelheid FarmVet AMITRAZ 20 % in 'n geskikte houer en voeg ongeveer 10 ℓ water daarby terwyl geroer word om 'n voormengsel te maak. Voeg die voormengsel dan by die water in die diptenk. Die eerste 50 diere wat gedip word, word gebruik om die dipmengsel deeglik te meng. Hierdie 50 diere moet weer gedip word. 1 ℓ FarmVet AMITRAZ 20 % is genoeg om 800 ℓ water te versterk.

Aan die einde van elke dipping, moet kalsiumhidroksied (75 %) teen 'n koers van 5 kg per 100 kop beeste gedip by die dipbak gevoeg word, om te verseker dat die dipmengsel se pH in die omgewing van 12 is.

### • **“Head Count” Aanvulling Stelsel**

Na dipping gebruik die onderstaande tabel om te bereken hoeveel FarmVet AMITRAZ 20 % by die dipbak bygevoeg moet word. Voeg die nodige hoeveelheid FarmVet AMITRAZ 20 % by die dipbak en maak dan vol met water tot by die vereiste vlak.

<b>Aantal diere gedip</b>	<b>Hoeveelheid Ecotraz 200 wat by die dipbak gevoeg moet word</b>
10	34 mℓ
20	69 mℓ
50	173 mℓ
100	347 mℓ
1000	3.475 ℓ

Nota: 1 ℓ Ecotraz 200 sal genoeg dipmengsel aanvul vir die dip van 287 beeste.

Aan die einde van elke dipping, moet kalsiumhidroksied (75 %) teen 'n koers van 5 kg per 100 kop beeste gedip by die dipbak gevoeg word, om te verseker dat die dipmengsel se pH in die omgewing van 12 is.

### **Diptussenpose:**

- **Bosluise en myte** Bespuit/dip weekliks
- **Luise** Bespuit/dip twee maal met 'n tussenpose van 7 dae

As die dip tussenpose langer as 3 weke is, moet addisionele kalk bygevoeg word teen 'n koers van 1 kg kalk (75 % aktief) per 1 000 ℓ water in die dipmengsel. As hierdie prosedure gevolg word behoort dit die dipmengsel vir 2 maande voldoende te beskerm.

### **SKAPE EN BOKKE**

FarmVet AMITRAZ 20 % behoort soos volg aangewend te word:

1. 2 Dippings met vars, ongestabiliseerde dipmengsel. FarmVet AMITRAZ 20 % moet bygevoeg word teen 'n koers van 1 ℓ per 600 ℓ water, met die totale hoeveelheid water in die dipbak in berekening gebring.  
OF
2. 'n Vars, ongestabiliseerde dipmengsel word gebruik vir die eerste dipping. Stabiliseer dan die dipmengsel deur kalk by te voeg teen 'n koers van 4 kg kalk per 750 ℓ dipmengsel, onmiddellik na die eerste dipping. Hierdie gestabiliseerde dipmengsel is dan geskik vir die tweede dipping 7 dae later.

### **Diptussenpose:**

Skaap en bokke moet twee keer gedip word met 'n 7 dae tussenpose om skaapbrandsiekte- jeuk en bokskurftemyte te dood. Verseker dat die diere vir ongeveer 1 minuut gedompel is, en dat hulle koppe ten minste 3 keer gedompel word om sodoende deeglike benatting van die binnekant van die ore te verseker.

### **L.W.**

Skaapbrandsiekte is 'n aanmeldbare siekte en moet by die naaste Staatsveearts aangemeld word.